



E.S.T.-MIX WSP

COMPOSITION :

Par g de produit :

Erythromycine (s.f. de thiocyanate)	180	mg
Sulfadiazine (s.f. de sodique)	150	mg
Triméthoprim	30	mg

DESCRIPTION :

Infections générales de l'appareil génito-urinaire, digestif ou respiratoire causées par des bactéries à Gram positif ou à Gram négatif et par Mycoplasma.

INDICATIONS :

E.S.T.-Mix wsp est indiqué dans les cas suivants:

Veaux, poulains	: Infections respiratoires et gastro-intestinales : bronchopneumonies, bronchites, entérites et diarrhées.
Porcins	: Colibacilloses, diarrhées, entérites, pneumonies enzootiques, bronchopneumonies, pleuropneumonies infectieuses, rhinites atrophiques, syndrome MMA, salmonelloses et stress.
Volailles	: MRC, bronchopneumonies, salmonelloses (pulloroses), typhoses, choléra aviaire, infections à E. coli, septicémies, entérites. Spécialement indiqué dans les cas où d'autres antibiotiques ou chimiothérapeutiques se révèlent inefficaces à cause de problèmes de résistance. Indiqué également dans le traitement préventif et curatif des coccidioses.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas administrer aux animaux présentant une hypersensibilité à sulfamides ou à l'érythromycine. Ne pas administrer aux animaux présentant une grave insuffisance hépatiques ou rénaux. Hypersensibilité croisée avec les macrolides.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Néant.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Administration par voie orale, dans l'aliment ou l'eau de boisson.

Volailles	: 100 g par 200 litres d'eau de boisson, pendant 5 jours (pour 2 500 poulets de 5 semaines, ou 1 500 poulets de 10 semaines ou 800 poules pondeuses, poulettes).
Porcins	: 1 - 2 g par 10 kg de poids vif par jour, dans l'eau de boisson, pendant 3 - 6 jours.
Veaux, poulains	: 7,5 g par 50 kg de poids vif par jour, pendant 3 - 6 jours.

Mélangé à l'aliment, le produit doit être utilisé immédiatement. L'eau médicamenteuse doit être utilisée dans les 24 heures.

TEMPS D'ATTENTE :

Tissus comestibles	: Volailles	: 12 jours
	Porcins, veaux, poulains	: 10 jours
Œufs		: 10 jours

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre 2 °C et 25 °C et à l'abri de la lumière.

A conserver dans l'emballage fermé.

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

PRÉSENTATION :

Sachet de 100 g (120 sachets par carton).

Pot PE-Pharma de 500 / 1 000 g (12 pots par carton).